



جمعية الإمارات
لأمراض المفاصل والروماتيزم
EMIRATES SOCIETY FOR
RHEUMATOLOGY

Methotrexate

How to Use:

Oral tablet or injection weekly, or as instructed by your physician. Take folic acid to reduce side effects.

كيفية الاستخدام:

قرص فموي أو حقنة
أسبوعياً، أو حسب
تعليمات الطبيب. يُوصى
بتناول حمض الفوليك
لتقليل الآثار الجانبية.

When to Call Your Doctor:

If you have nausea, vomiting, fever, breathing difficulty, infection, bruising or allergic reaction. If vaccination is required, surgery is needed or if you're traveling abroad.

متى يجب عليك الاتصال بطبيبك:

إذا كنت تعاني من غثيان، أو تقيؤ، أو حمى، أو صعوبة
في التنفس، أو عدوى، أو كدمات غير عادية، أو رد
فعل تحسسي. إذا كانت هناك حاجة للتطعيم، أو
لإجراء عملية جراحية، أو إذا كنت مسافراً إلى الخارج.

Common Side Effects:

Nausea, vomiting, risk of infection, fatigue, mouth sores, liver enzyme abnormalities, reduced white cells

الأعراض الجانبية الشائعة:

غثيان، تقيؤ، خطر الإصابة بالعدوى،
تعب، تقرحات في الفم، اضطرابات
في إنزيمات الكبد، وانخفاض في
عدد خلايا الدم البيضاء.

www.esr.ae

